



営農タイムリー！



発生予察情報について

2022年8月1日発行

病害虫発生予報注意報 第2号

京都府病害虫防除所より

病害虫発生予察**注意報** 第2号が発表されました。

作物名	水稲
病害虫名	いもち病（穂いもち）
1. 発生地域	府内全域
2. 発生量	平年比多い
3. 防除時期	穂ばらみ期～穂揃期

防除上の留意事項

- (1) 上位葉へ進展した葉いもちの病斑は、穂いもちの重要な伝染源となる。
- (2) コシヒカリ、ヒノヒカリ、祝など発病しやすい品種や、すでに葉いもちが多発している田、山間部では特に注意し、防除適期に薬剤防除を実施する。
- (3) **出穂後曇天が続く場合には、傾穂期前後にも防除を行う。**特に枝梗は遅くまで菌の侵入を受けるので、**枝梗いもちの発生に注意**する。
- (4) **葉いもちの発生が多い場合は、治療効果がある薬剤**（カスガマイシン剤：商品名カスミン剤等、フェリムゾン・フラサイド剤：商品名ブラシン剤等）**で防除する。**
- (5) 防除の際には、周辺ほ場に農薬が飛散しないよう十分に注意する。
- (6) 特別栽培米に取り組んでおられる方は、農薬を使用する前に、普及センターや農協に相談してください。
- (7) 農薬の選択に当たっては普及センター、農協等と相談し、使用時期（収穫前日数）や使用回数等の使用基準を遵守して適正に使用する。

いもち病に登録のある主な薬剤

いもち病（治療効果）薬剤

2022.7月 現在

FRAC コー	薬剤名	希釈倍数、使用量	使用時期 /使用方法	本剤の 使用回数	成分別 総使用回数
U14(U) 16.1(I1)	ブラシンフロアブル [フェリムゾン+ラブサイト]	1000倍 60～150L/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内:3回以内
		300倍 25L/10a	収穫7日前まで 【ブームスプレーヤー】		
	ブラシン粉剤DL [フェリムゾン+ラブサイト]	3～4kg/10a	収穫7日前まで	2回以内	
16.1(I1) U14(U)	ノンブラスフロアブル [ビーム+フェリムゾン]	1000倍 60～150L/10a	収穫7日前まで	2回以内	4回以内(育苗箱への処理は1回以内、本田では3回以内):2回以内
		300倍 25L/10a	収穫7日前まで		
	ノンブラス粉剤DL [ビーム+フェリムゾン]	3～4kg/10a	収穫7日前まで		
24(D3)	カスミン液剤	1000倍 60～150L/10a	穂揃期まで	2回以内	4回以内(但し、種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)
24(D3) 16.1(I1)	ダブルカットフロアブル [カスミン+ビーム]	1000倍 60～200L/10a	穂揃期まで	2回以内	4回以内(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内):4回以内(育苗箱への処理は1回以内、本田では3回以内)
		300倍 25L/10a			
	ダブルカット粉剤3DL [カスミン+ビーム]	3～4kg/10a	穂揃期まで	2回以内	
U16(U)	トライフロアブル	250倍 25L/10a	収穫14日前まで 【ブームスプレーヤー】	2回以内	2回以内
		1000倍 60～150L/10a	収穫14日前まで		
11(C3)	アミスターエイト	1000～1500倍 300倍 25L/10a	収穫14日前まで	3回以内	4回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内)

稲のいもち病とカメムシ類 登録薬剤

2022.7月現在 No.1

RAC コード	薬剤名	希釈倍数、 使用量	使用時期 / 使用方法	本剤の 使用回数	成分別 総使用回数
I:2B F:11(C3)	イモチエースキラップ粒剤	3kg/10a	収穫35日前まで / 湛水散布	1回	2回以内(は種時(直播)又 は移植時までの処理は1回 以内):1回
	ワイドパンチ豆つぶ [イモチエース+キラップ]	250g/10a	収穫35日前まで	1回	
I:4A F:11(C3)	イモチエーススタークル粒剤	3kg/10a	収穫35日前まで	1回	4回以内(育苗箱への処理及び 側条施用は合計1回以内、本 田での散布、空中散布、無人 ヘリ散布は合計3回以内):1回
I:2B F: U14(U) F: 16.1(I1)	ブラシキラップフロアブル	1000倍 60~150L/10a ----- 300倍 25L/10a	収穫14日前まで	2回以内	2回以内(は種時(直播)又 は移植時までの処理は1回 以内):2回以内:3回以内
	ブラシキラップ粉剤DL	3~4kg/10a	収穫14日前まで	2回以内	
I:3A F: U14(U) F: 16.1(I1)	ブラシジョーカーフロアブル	1000倍 60~150L/10a ----- 300倍 25L/10a	収穫14日前まで	2回以内	2回以内:2回以内:3回以内
	ブラシジョーカー粉剤DL	3~4kg/10a	収穫7日前まで	2回以内	
I:2B F: U16(U)	トライKフロアブル [トライ+キラップ]	1000倍 60~150L/10a ----- 250倍 25L/10a	収穫14日前まで	2回以内	2回以内(但し、は種時(直 播)又は移植時までの処理 は1回以内):2回以内
	トライK粉剤DL [トライ+キラップ]	3~4kg/10a	収穫14日前まで		
I:3A F:11(C3)	アミスタートレボンSE	300倍 25L/10a ----- 1000倍 60~150L/10a	収穫14日前まで	3回以内	3回以内:4回以内(育苗箱 散布は1回以内、本田では3 回以内)
I:4A F: 16.1(I1)	ビームスタークル微粒剤F	3~4kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	4回以内(育苗箱への処理及び 側条施用は合計1回以内、本 田での散布、空中散布、無人 ヘリ散布は合計3回以内):4回 以内(育苗箱への処理は1回以 内、本田では3回以内)
	ビームスタークル粉剤5DL	3~4kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	
I:4A F: U14(U) F: 16.1(I1)	ブラシダントツフロアブル	1000倍 60~150L/10a ----- 300倍 25L/10a	収穫7日前まで	2回以内	4回以内(直播での種時又は 移植時までの処理は1回以内、 本田での散布、空中散布、無 人ヘリ散布は合計3回以内):2 回以内:3回以内
		ブラシダントツ粉剤DL			