



# 営農タイムリー！

## 発生予察情報について



2022年8月1日発行

### 病害虫発生予報注意報 第3号

京都府病害虫防除所より

病害虫発生予察**注意報** 第3号が発表されました。

作物名	水 稻
病害虫名	斑点米カメムシ類
1. 発生地域	府内全域
2. 加害時期	出穂後収穫期まで
3. 発生量	平年比多い
4. 防除時期	穂揃期及び傾穂期

#### 防除上の留意事項

##### (1) 耕種的防除

斑点米カメムシ類はイネ科雑草の種子を餌にする。したがって、水田周辺のカメムシ類の生息密度を下げるためには、畦畔の草刈りを行うことが有効である。草刈りは、イネが出穂する2～3週間前と出穂直前の2回行うと効果的である。作業の都合上、1回で済ませる場合は、必ず出穂の10日前までに草刈り等を済ませる。

出穂期に近づきすぎてから行くと、カメムシ類を水田に追い込み、かえって逆効果となる。水田内のイネ科雑草は、カメムシ類の水田への侵入を助長するので出穂前に除草する。

##### (2) 農薬による防除

カメムシ類の密度が高い水田では、薬剤による防除を穂揃期と傾穂期の2回行うことが望ましい。

農薬の散布にあたっては散布適期を確認し、周辺作物に飛散しないよう十分注意する。また農薬の選択にあたっては、使用基準を遵守して適正に使用する。特に、特別栽培米に取り組んでおられる方は、普及センター、JA等と相談してください。

稲 カメムシ 登録薬剤

2022.7月現在 No.1

IRAC コード	薬剤名	希釈倍数、使用量	使用時期 / 使用方法	本剤の 使用回数	成分別 総使用回数
1B	エルサン乳剤	1000倍 60～150L/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内
	エルサン粉剤2	4kg/10a	収穫7日前まで	2回以内	
	スミチオン乳剤	1000倍 60～150L/10a	収穫21日前まで	2回以内	3回以内(但し、種もみ への処理は1回以内、 育苗箱散布は1回以 内、本田では2回以内)
		300倍 25L/10a	収穫21日前まで 【ブームスプレーヤー】		
	スミチオン微粒剤F	4kg/10a	収穫21日前まで	2回以内(但し、 出穂前は1回)	
スミチオン粉剤3DL	3～4kg/10a	収穫21日前まで	2回以内(但し、 出穂前は1回)		
2B	キラップフロアブル	500倍 25L/10a	収穫14日前まで	2回以内	
		1000～2000倍 60～200L/10a			
	キラップ微粒剤F	3～4kg/10a	収穫14日前まで	2回以内	
	キラップ粉剤DL	3～4kg/10a	収穫14日前まで	2回以内	
2B 3A	キラップジョーカーフロアブル	1000倍 60～150L/10a	収穫14日前まで	2回以内	2回以内(は種時(直播) 又は移植時までの処理 は1回以内):2回以内
	キラップジョーカー粉剤DL	3～4kg/10a	収穫14日前まで	2回以内	
3A	MR. ジョーカーEW	2000倍 60～150L/10a	収穫14日前まで	2回以内	2回以内
		500倍 25L/10a			
	MR. ジョーカー粉剤DL	3～4kg/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内
	トレボンEW	1000倍 60～150L/10a	収穫14日前まで	3回以内	3回以内
	トレボンMC	2000倍 60～150L/10a	収穫14日前まで	3回以内	
		600倍 25L/10a			
トレボン乳剤	2000倍 60～150L/10a	収穫14日前まで	3回以内		
600倍 25L/10a	収穫14日前まで 【ブームスプレーヤー】				
トレボン粉剤DL	3～4kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	
3A 4A	スタートレボンW10	1000倍 60～150L/10a	収穫14日前まで	3回以内	3回以内:4回以内(但 し、育苗箱への処理及 び側条施用は合計1回 以内、本田での散布、 空中散布、無人航空機 散布は合計3回以内)
	トレボンスターフロアブル	1000倍 60～150L/10a	収穫14日前まで	3回以内	
		300倍 25L/10a	収穫14日前まで 【ブームスプレーヤー】		
トレボンスター粉剤DL	3～4kg/10a	収穫7日前まで	3回以内		

IRAC コード	薬剤名	希釈倍数、使用量	使用時期 / 使用方法	本剤の 使用回数	成分別 総使用回数
4A	スタークル液剤10	300倍 25L/10a	収穫7日前まで 【ブームスプレーヤー】	3回以内	4回以内(但し、育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)
		1000倍 60~150L/10a	収穫7日前まで		
	スタークル豆つぶ	250g/10a	収穫7日前まで	3回以内	
	スタークル粉剤DL [アルバリン粉剤DL]	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	
	スタークル粒剤 [アルバリン粒剤]	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	
	スタークル顆粒水溶剤 [アルバリン顆粒水溶剤]	2000倍 60~150L/10a	収穫7日前まで	3回以内	
	ダントツフロアブル	5000倍 60~150L/10a	収穫7日前まで	3回以内	
		1250倍 25L/10a	収穫7日前まで 【ブームスプレーヤー】		
	ダントツ水溶剤	4000倍 60~150L/10a	収穫7日前まで	3回以内	
1000倍 25L/10a		収穫7日前まで 【ブームスプレーヤー】			
ダントツ粉剤DL	3~4kg/10a	収穫7日前まで	3回以内		
ダントツ粒剤	3~4kg/10a	収穫7日前まで	3回以内		
4A 16	アプロードスタークルゾル	1000倍 60~150L/10a	収穫7日前まで	3回以内	4回以内(育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内):4回以内(小包装投入は1回以内)
4C	エクシードフロアブル	2000倍 60~150L/10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内
		500倍 25L/10a			
	エクシード粉剤DL	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	
4F	エミリアフロアブル	1000倍 60~150L/10a	収穫7日前まで	2回以内	3回以内(直播での種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)
		250倍 25L/10a			